

A close-up photograph of several large, vibrant pink roses in full bloom. The petals are layered and have a soft, velvety texture. The centers of the flowers are filled with bright yellow stamens. The background is a lush green, slightly out-of-focus garden setting with more foliage and a few unopened rose buds.

Le Rosier

Taille et fumure


Jean-Luc BOULARD - Société Horticole de Sens

Parc du Moulin à Tan – 28, Chemin de Babie – 89100 SENS

Tél. : 03.86.95.38.72 Fax : 03.86.95.39.41

Courriel : shs-89@wanadoo.fr

Classification horticole



Abréviations des noms de classe

(se reporter au chapitre « l'histoire de la rose » pour explications)

A : Alba	M : Moussu
Alp : Alpina	Min : Miniature
Arv : Arvensis	Mlt : Multiflora
B : Bourbon	N : Noisette
C : Centifolia	P : Portland
Ch : Chinensis	Pim : Pimpinellifolia
D : Damas	Pol : Polyantha
E : Eglanteria	Rug : Rugosa
F : Floribunda	Sx : Sarmenteux
Ft : Fœtida	T : Thé
G : Gallica	Wich : Whichuraiana
Gr : Grandiflora	Hr : Hybride Rem

H précédent la
classe signifie
HYBRIDE de

CL précédent la
classe signifie
CLIMBING de

Dans la pratique commerciale les roses horticoles sont classées plus simplement :

Les Rosiers buissons remontants à grandes fleurs comprennent les hybrides de Thé et les Grandiflora.

Ce sont les roses nobles ; touffes peu ramifiées à tiges uniflores parfois pluriflores (1 à 3 fleurs) ; fleurs grandes ou assez grandes, doubles, bien formées, hauteur allant de 0,70 m à 1,20 m.

Les rosiers buissons remontants à fleurs groupées ou Floribunda

Touffes plus ou moins ramifiées à hampes portant plus de 5 fleurs moyennes, doubles ou semi-doubles ; hauteur de 0,60 m à 1,20 m.

Les rosiers buissons remontants à fleurs en bouquets ou hybrides de Polyanthas ou Polyanthas

Touffes assez ramifiées à hampes portant de nombreuses fleurs plutôt petites, dou-

bles, semi-doubles ou simples ; hauteur 0,40 m à 0,70 m.

Miniatures ou Chinensis

Touffes très ramifiées dès la base à folioles étroites et très petites fleurs nombreuses ; hauteur 0,15 m à 0,60 m.

Grimpants remontants ou sarmenteux

Rosiers d'origine contemporaine à rameaux assez longs plus ou moins souples, nécessitant un soutien, à fleurs généralement moyennes ou petites.

Climbing ou grimpants

Il s'agit d'une variation végétative d'un rosier buisson. La forme grimpante conserve tous les autres caractères de la variété dont elle est issue.

Rosiers grimpants non remontants

Pour la plupart, des rosiers sarmenteux à longs rameaux souples fort appréciés au XIX^e siècle.

Rosiers anciens

Buissons en général non remontants dont l'origine est antérieure au milieu du XIX^e siècle.

Rosiers arbustifs

On trouve sous cette dénomination des rosiers botaniques, des rosiers anciens, des rosiers modernes fréquemment à fleurs groupées ou en bouquet dont la hauteur est supérieure à 1,20 m ; ne nécessitant que peu ou pas de taille et devant être employés comme des arbustes à fleurs.

Rosiers tiges

Buissons remontants greffés sur une tige d'églantier entre 0,50 m et 1,20 m au-dessus du sol.

Rosiers pleureux

Rosiers grimpants, en général non remontants, à rameaux très souples, greffés sur une tige d'églantier entre 1,80 et 2,20 m du sol.



Taille époques

Époque de taille

Nous donnons ci-après en détail les indications concernant l'époque de taille favorable pour les différents groupes de rosiers.

Taille d'hiver

La taille d'hiver se pratique au mieux de la mi-février à la mi-mars, compte tenu de la région et des conditions atmosphériques. Une taille hâtive en décembre-janvier peut provoquer un départ de végétation qui subira des dommages par les gelées à venir.

Une taille tardive en avril arrêtera un rosier dans son élan végétatif. La meilleure période à choisir est celle où les bourgeons commencent à gonfler.

Après la taille d'hiver, répandez une couche de terreau ou de fumier consommé au pied des rosiers. Cela favorisera la croissance des rameaux par un apport de nourriture.

Des dommages sont souvent provoqués par le gel, en particulier quand des gelées surviennent après une période de temps doux.

Si les jeunes pousses sont ainsi détruites, il faut les supprimer par une nouvelle taille sur œil dormant.

Hybride de thé



Inflorescence d'un hybride de thé correctement taillée

Rabattre sur une pousse vigoureuse tournée vers l'extérieur ou sur un œil au-dessous de l'inflorescence.

Floribunda



Inflorescence de floribunda correctement taillée

Couper le bouquet en se rabattant sur la première pousse vigoureuse tournée vers l'extérieur ou sur un œil.


Taille d'été

Il s'agit, en fait, d'un nettoyage d'entretien qui consiste à couper les fleurs fanées tout au long de la belle saison. Quelques roses, telles que Scarlet Fire et *Rosa moyesii*, sont cultivées non seulement pour leurs fleurs, mais pour leurs fruits hautement colorés. Il ne faut donc pas couper les fleurs dans ces cas particuliers. Par ailleurs, débarrasser les rosiers de leurs fleurs fanées a tous les avantages. C'est une économie de sève dont profitent les boutons à venir et une mesure d'hygiène en évitant que des moisissures se développent sur les pétales fanés tombés sur le sol. Couper la fleur fanée à hauteur d'un œil vigoureux sur la tige. Ne jamais couper la tige d'une fleur plus longue que nécessaire pour la mettre dans un vase. Ne pas non plus couper en même temps plusieurs roses sur la même plante, car les feuilles enlevées manqueront à l'équilibre végétatif.

Taille d'automne

Dans les régions de grands vents dominants, il est prudent de raccourcir les très longues branches en novembre. Ceci évite l'ébranchement de l'assise radicaire.

TAILLE D'EXPOSITION



Les roséristes qui exposent sur un plan national ou local ont à cœur de présenter des fleurs de haute qualité à une date donnée. Ceci suppose une grande expérience et une connaissance approfondie de toutes les variétés. Cet ouvrage n'a pas pour objet d'être un guide à l'usage d'éventuels présentateurs. Disons simplement que la taille d'hiver doit être sévère pour limiter le nombre de pousses; pour ce qui est des hybrides de thé, supprimer les boutons latéraux pour ne laisser qu'une fleur par tige




Inflorescence d'un hybride de thé mal taillée (coupe trop courte, affaiblissement de la plante)



Inflorescence de floribunda mal taillée (coupe trop longue)

POUSSES BORGNES




Certaines variétés d'hybrides de thé et de floribundas ainsi que de grimpants produisent des pousses « borgnes » qui ne fleurissent pas. Il faut les supprimer dès leur apparition pour stimuler la croissance des pousses florifères, si l'on ne veut pas s'exposer à une diminution du potentiel de floraison

Taille principes généraux 1

La plupart des gens cultivent quelques rosiers dans leur jardin ou contre les murs de leur maison, mais pour bon nombre de rosiers la taille des rosiers est chose commune. Les rosiers sauvages produisent chaque année de nouvelles pousses vigoureuses à la base des plantes. Les pousses latérales qui s'y développent s'affaiblissent progressivement à l'apparition de nouvelles pousses vigoureuses, la nourriture prélevée par les racines leur profite au détriment des rameaux d'origine qui s'épuisent et meurent parfois. Le but de la taille est de rééquilibrer la répartition de la sève sur des rameaux sains et vigoureux pour assurer une floraison de qualité. La taille est une opération simple, mais, pour les rosiers vont des miniatures de 25 cm de haut, jusqu'aux grimpants qui peuvent atteindre une dizaine de mètres, la technique est évidemment différente pour les uns et les autres.

Malgré cela, néanmoins, des principes fondamentaux de taille qui s'appliquent à toutes les espèces de rosiers.


Toujours utiliser un sécateur bien affûté pour faire une coupe nette. Si le bois est déchiré et meurtri, le rameau risque de se sécher et mourir (a). La coupe ne doit pas se situer à plus de 5 à 6 mm au-dessus de l'œil. Si vous coupez trop haut, le « chicot » va se dessécher (c); une coupe trop proche de l'œil peut l'endommager (d); une coupe mal orientée risque de créer un foyer de moisissure autour de l'œil.



Toujours tailler sur bois sain. Si, à la dernière coupe, le cœur du bois s'avère mort, recommencer l'opération jusqu'à ce qu'apparaisse un bois bien vert.

3. Choisir de préférence un œil orienté vers l'extérieur de la plante.


4. Des rosiers vigoureux d'obtention récente émettent souvent 2 ou 3 départs à partir d'un œil après la taille. Il ne faut en laisser qu'un et pincer les autres.



Les yeux à bois des rosiers se situent à l'aisselle des feuilles. Si la feuille est tombée, on peut les voir juste au-dessus du point d'où le pétiole s'est détaché.

5. Éliminer en totalité tout bois sec ou malade (a) ainsi que les rameaux malingres (b). Si une branche est fourchue, couper au ras de la fourche pour ne laisser qu'une tige (c).

Pour les rosiers grimpants ainsi que pour



les grands buissons ce n'est pas toujours très facile, mais chaque fois que cela est possible, veiller à ce que les branches ne soient pas accolées les unes aux autres.


6. Maintenir chaque branche espacée de sa voisine pour laisser passer air et lumière. Cette précaution empêche les maladies cryptogamiques de se développer.

7. Brûler tout ce qui a été supprimé par la taille pour éliminer efficacement tous les germes de maladie.


Il peut arriver que vous ne sachiez pas à quel groupe appartiennent vos rosiers, si vous avez emménagé en hiver et qu'il n'y ait pas d'étiquettes sur les plantes. Tenez-vous en alors aux principes généraux de taille. Vous serez en mesure de vous y reconnaître au moment de la floraison. La technique de taille varie selon les conditions de lieu et de climat. La nature du sol a aussi son influence sur la végétation.

GOURMANDS

La plupart des rosiers sont greffés sur les racines d'églantiers sauvages. Pendant la période de végétation, des pousses prennent naissance au-dessous du point



de greffage. Elles sont nuisibles et il faut les éliminer dès leur apparition. Il faut rechercher, en dégageant la terre, le point de départ du gourmand sur la racine et le détacher. Ne jamais le couper au niveau du sol, ce qui le porterait simplement à se ramifier.



Sur les rosiers standards (greffés en haut d'une tige) des gourmands peuvent apparaître le long de la tige porte-greffe. Il faut aussitôt les supprimer.

Taille des rosiers type buissons

Floribundas

Les rosiers floribundas sont plus vigoureux que la plupart des hybrides de thé et hybrides perpétuels. Ils produisent une succession de grands bouquets de fleurs de taille moyenne. Il est quelquefois difficile de tailler les floribundas pour obtenir le plus grand nombre de fleurs. Une taille sévère, comme elle est pratiquée sur les hybrides de thé et perpétuels, peut affaiblir les floribundas au bout de quelques années, alors qu'une taille légère assure la production de beaux bouquets.

Une taille modérée de chaque pousse à 6-8 yeux, soit 15 à 20 cm, est le plus souvent recommandée et a fait ses preuves, en particulier dans les régions ventées. Elle ne donne, toutefois, pas toujours la floraison estivale presque continue qu'on en attend et le vieux bois a tendance à s'épuiser sans pour autant être remplacé par de jeunes pousses.

La combinaison alternée de taille sévère et modérée, qui assure à la fois le renouvellement du bois et une floraison prolongée, s'avère la meilleure méthode. La taille annuelle a lieu de mi-février à mi-mars. Cette période varie

en fonction de la nature du sol et des conditions météo.

La première année

Les floribundas sont habituellement livrés avec 3 à 5 fortes pousses et d'autres plus faibles. Entre mi-février et mi-mars, tailler les premières à 3-5 yeux (15 à 22 cm) et éliminer tout le reste.

La deuxième année

De mi-février à mi-mars, toutes les pousses d'un an doivent être raccourcies du tiers de leur longueur et les latérales taillées à 2-3 yeux (10-15 cm). Les pousses qui ont été taillées à la plantation doivent l'être à nouveau à 3-5 yeux et éclaircies pour conserver le centre du buisson aéré.

La troisième année et les suivantes

Le programme de renouvellement se poursuit entre mi-février et mi-mars. Raccourcir les pousses d'un an d'un tiers et tailler le bois de 2 ans à 3-5 yeux, soit à 22-25 cm du sol. Si le buisson est trop touffu, l'éclaircir de la base.

La première année



1. Automne

A la réception, tailler légèrement les pousses et rafraîchir les racines.



2. Mi-février à mi-mars


Tailler toutes les pousses à 3-5 yeux (15 à 22 cm). Éliminer les pousses faibles. En avril-mai, les nouvelles pousses vont se développer.



3 Octobre


La végétation tire à sa fin. Raccourcir les plus grandes pousses et éliminer les inutiles.

La deuxième année



4. Mi-février à mi-mars


Éliminer le bois mort ou malade, les tiges faibles, fourchues et celles orientées vers l'intérieur. Tailler les pousses d'un an d'un tiers. Tailler le vieux bois à 3-5 yeux (15 à 22 cm) et les pousses latérales à 2-3 yeux (10 à 15 cm).



5. Octobre


Fin de la végétation de la 2^e saison. Taille saisonnière d'entretien.

La troisième année et les suivantes



6. Mi-février à mi-mars

Tailler le bois mort et malade; les tiges faibles, les fourches et les tiges orientées vers l'intérieur.



7. Dans le même temps

Tailler toutes les pousses principales d'un an au tiers et les latérales à 2-3 yeux (10 à 15 cm). Tailler le vieux bois à 3-5 yeux (15 à 22 cm du sol) et, si le buisson est trop touffu, l'éclaircir de la base.



Ce rosier buisson, délaissé pendant quelques années, a besoin d'une taille de nettoyage plus importante qu'à l'ordinaire. Ne vous inquiétez pas de la quantité coupée!



Ce rosier moderne très peu vigoureux a droit à une taille très sévère, pour encourager les pousses de la base.

13

Rosiers greffés sur tige

Les hybrides de thé et les floribundas sont fréquemment cultivés sur tige ou demi-tige pour donner de la hauteur aux massifs de rosiers au jardin.

Ils sont habituellement greffés sur des tiges de *Rosa rugosa*, ou d'églantier commun, mais sont beaucoup moins populaires ces dernières années en raison de l'importance et du poids de la tête par rapport à la tige de faible diamètre qui doit être soigneusement tuteurée. La taille est la même que pour des variétés identiques quand elles sont buissonnantes.


Une taille légère augmente le volume de la tête qui sera plus vulnérable au vent.

Il faut donc tailler plus court. Les hybrides de thé à 3-5 yeux (15 cm), les floribundas à 6-8 yeux (25 cm) pour les pousses d'un an et à 3-6 yeux (15 cm) pour toutes les pousses de 2 ans.


Les greffés sur tige pleureurs

Les rosiers grimpants sont greffés sur de hautes tiges de *Rosa rugosa*, ou églantier commun, de sorte que les longues pousses souples retombent naturellement. Les pleureurs des variétés de rosiers sarmenteux et grimpants du 1^{er} groupe (page 26) peuvent être du plus bel effet quand ils sont cultivés correctement. Leur taille est très simple. En août-septembre, couper entièrement les pousses de 2 ans qui ont fleuri et conserver les jeunes pousses à fleurir la saison suivante. Si celles-ci sont insuffisantes, en réserver quelques vieilles bien placées, en taillant les départs latéraux sur 2-3 yeux (15 cm). Les variétés de sarmenteux et de grimpants du 2^e groupe se prêtent moins bien à cette forme de culture. Même taille que ci-dessus. Attacher les jeunes pousses fortes au fur et à mesure de leur développement.


La première année




1. Février à mars
Tailler les fortes tiges à 3-5 yeux (15 cm).



2. Octobre à novembre
En fin de végétation, tailler l'extrémité des tiges principales et supprimer les pousses *non* *arrivées*




La deuxième année et les suivantes



3. Février à mars
Supprimer le bois mort, malade, faible et *faible*

L'ÉCUSSONNAGE DES ROSIERS TIGES



La meilleure façon de les multiplier est par l'insertion de 2 écussons de chaque côté de la tige. On obtient ainsi une tête équilibrée. Si on n'utilise qu'un seul écusson, on risque d'avoir un développement irrégulier. Lorsque vous achetez un rosier standard, assurez-vous qu'il a un double écussonnage.



4. Dans le même temps
Tailler les jeunes pousses à 3-5 yeux (15 cm) et les pousses latérales conservées à 2 à 4 yeux (10-12 cm)



Taille grimpants et sarmenteux Non Remontants

Grimpants et sarmenteux

Le deuxième groupe comprend de nombreux rosiers vigoureux bien connus, tels que « Albertine » et « Chaplin's pink ». Ils fleurissent une fois en été sur les pousses latérales des longues tiges de l'année précédente. Ils diffèrent des vrais sarmenteux en ce sens qu'ils émettent très peu de pousses à la base à chaque saison, la végétation nouvelle se manifestant plus haut sur les vieilles tiges. L'objet de la taille est de supprimer le vieux bois pour faire place aux jeunes pousses.

La première année


Les rosiers nouvellement plantés de ce groupe doivent être traités de la même façon que ceux du 1^{er} groupe.

Les deuxième, troisième années et les suivantes

La taille des plantes établies doit se faire immédiatement après la floraison. Couper une ou deux vieilles tiges et les remplacer par des jeunes. Si les jeunes pousses font défaut, se contenter de tailler une ou deux vieilles tiges à 30 ou 40 cm de la base. Tailler le vieux bois à hauteur d'un départ vigoureux. Guider au fur et à mesure de

leur développement les jeunes pousses aussi près de l'horizontale que possible. Tous les départs latéraux sont à tailler à 2-3 yeux (15 cm).


La deuxième année



1. Juin à juillet

Les plantes fleurissent sur les latéraux qui ont poussé sur le bois de l'année précédente, tandis que les pousses nouvelles de la base se développent.

La troisième année et les suivantes



3. Juin à juillet


La floraison a lieu sur le bois de l'année précédente. Les tiges de remplacement commencent à se développer.



2. Août à septembre

Tailler le vieux bois pour favoriser le développement des jeunes pousses

principales. Tailler les latéraux à 2-3 yeux (15 cm). Guider les pousses les plus fortes à l'horizontale.



4. Août à septembre

Recommencer la taille indiquée au sous-titre 2 (2^e année). Tailler une ou deux vieilles tiges à 30 ou 40 cm de la base


pour provoquer des départs

Taille grimpants et sarmenteux Remontants

8

Grimpants et sarmenteux

La première année



1. Automne ou début du printemps
A la plantation, les rosiers ont 3 à 4 pousses de 1,20 m à 1,50 m de long. Ne pas tailler, sauf les pousses faibles, et rafraîchir les racines.

2. Juillet à août
Attacher les pousses au fur et à mesure de leur développement. Quelques fleurs se présentent à l'extrémité des nouvelles pousses. Taille d'entretien d'été.

Le 3^e groupe comprend les sarmenteux et les grimpants qui fleurissent sur le bois de l'année. On peut y incorporer les grimpants du type hybride de thé et les sports grimpants des hybrides de thé et des floribundas. La plupart, mais pas tous, sont remontants. Leurs pousses longues et flexibles conviennent parfaitement au palissage le long des murs, clôtures et pergolas.


jours rafraîchir les racines. Beaucoup de sports grimpants sont issus de rosiers buissonnants, et une taille sévère à la plantation risquerait de les ramener à leur forme initiale.

Il est essentiel de construire une ossature de branches régulièrement espacées, car le rosier de ce groupe ne produit pas facilement des pousses de base vigoureuses une fois établis, mais plutôt de jeunes pousses plus haut sur les fortes tiges existantes.

La première année
Les rosiers de ce groupe ne devraient pas être taillés à la plantation, ce qui n'exclut pas l'élimination des pousses faibles. Tou-


Un palissage horizontal des pousses à leur début empêchera la base de se dégarnir.

La deuxième année et les suivantes




3. Octobre à mars
Tailler les pousses latérales qui ont fleuri à 3-4 yeux (15 cm), éliminer le bois *maigre et attache les tiges principales*

4. Juillet-août
Les fleurs apparaissent au sommet des nouvelles pousses et sur les pousses *latérales. Attache les nouvelles tiges à mesure*



5. Octobre à mars
Tailler les pousses latérales qui ont fleuri à 3-4 yeux (15 cm). Éliminer le bois *maigre. Attache les pousses à mesure*







Taille- rajeunissement de grimpants et sarmenteux









Rosiers botaniques et rosiers arbustifs

Ces rosiers sont bien moins cultivés que les hybrides de thé et les floribundas, mais connaissent un regain de popularité. Groupés ou isolés parmi d'autres plantes de « mixed borders », ils sont remarquables durant l'été et l'automne, en particulier dans des massifs irréguliers, là où des rosiers modernes n'auraient pas leur place.

Il est souvent recommandé de laisser les rosiers arbustifs pousser à leur guise sans être taillés. Les entretenir propres suffit. Dans ces conditions, ils vont pousser et fleurir assez bien pendant quelques années, mais cette solution de facilité n'assurera pas longtemps le résultat escompté. Il est donc utile de procéder quand même à une taille, ne serait-elle que superficielle. Étant donné le nombre assez considérable de types dans ces groupes, la technique de taille peut être différente selon les sujets. On doit cependant appliquer les mêmes principes de taille que pour les autres rosiers (voir pages 14, 15), c'est-à-dire provoquer de bons départs à la base

pour remplacer les vieilles tiges qui ont perdu de leur vigueur et ne donnent que des fleurs clairsemées.

Il est également important de souligner que les fleurs de certaines variétés peuvent provenir du bois de l'année tard en saison ou sur les pousses latérales d'un bois plus ancien. Par ailleurs, il est des variétés qui fleurissent d'un seul jet en juin-juillet, tandis que d'autres sont remontantes et fleurissent jusqu'en automne. Quelques-unes enfin produisent des fruits très décoratifs; dans ce cas, on ne touche pas aux fleurs fanées, bien entendu.

En résumé, il faut s'en tenir aux règles ci-après :

1. Pas de taille à la plantation. On rafraîchit simplement les racines et les pousses meurtries ou cassées.
2. Établir une solide ossature de tiges maitresses régulièrement espacées et supprimer tout bois malade, mort ou trop faible.

3. Enlever les fleurs fanées sauf quand elles doivent être suivies de fruits décoratifs. Les variétés remontantes, tels les hybrides musqués, tirent profit de la taille qui revigore les pousses florifères.
4. La taille de l'extrémité des pousses principales en hiver est une excellente chose pour provoquer l'émission de pousses latérales. En même temps on empêche le mildiou de s'installer dans les parties tendres qu'il affectionne.

Le 1^{er} groupe réunit les rosiers suivants, qui ne demandent qu'une taille minimale pendant des années :

Rosiers botaniques (autres que grimpants) et leurs proches hybrides.

Rosa spinosissima, le rosier Burnet et ses dérivés.

Rosa rugosa, le rosier japonais et ses dérivés, les rosiers gallica, les rosiers musqués hybrides.

Presque tous ces rosiers ont une végéta-

tion dense et buissonnante. Ils fleurissent principalement sur des pousses latérale courtes issues d'un bois de 2 ans ou plus. Une fois établis, ils ne produisent pas régulièrement des pousses vigoureuses à la base.

La première et la deuxième année

Dans la 1^{re} et la 2^e année qui suivent la plantation, la taille se ramène plus ou moins aux points 1 à 4 expliqués dans l'introduction de cette section. Occasionnellement, un pousse mal placée demande à être supprimée à la base.

La troisième année et les suivantes

Au cours de ces années, éliminer une ou deux vieilles tiges maitresses qui ne donnent plus que des fleurs clairsemées. Cela régénère l'ossature en provoquant l'émission de nouvelles pousses à la base. Un traitement plus rigoureux doit être appliqué aux très vieux rosiers. Il faut supprimer les plus vieilles tiges pour obtenir du jeune bois.

La deuxième année



1. Février à mars

Tailler l'extrémité tendre de toutes les pousses vigoureuses; supprimer toute pousse mal placée à la base. Les pousses de base se sont développées

2. Juin à août

La floraison a lieu sur les latéraux du vieux bois.

3. Septembre

Taille d'entretien d'été. Éliminer tout ce qui est malade, faible ou mort.

Troisième année et suivantes



4. Février à mars

Tailler l'extrémité des pousses principales et latérales si nécessaire. Rabattre une ou deux vieilles tiges maitresse qui ne font plus

5. Juin à août

La floraison a lieu sur les latéraux du vieux bois. Développement des nouvelles pousses de base.

6. Septembre

Taille d'entretien d'été. Éclaircir la plante après la floraison pour équilibrer l'ossature avec des tiges régulièrement espacées

Taille botaniques et arbustifs 3

Rosiers botaniques et rosiers arbustifs

Le 3^e groupe peut être considéré comme une variante mineure du 2^e. Il comprend la plupart des rosiers de Chine et un certain nombre de variétés modernes comme « Fountain ». Parmi les « vieilles roses », beaucoup de Bourbons, comme « Zéphirine Drouchin » et « Mme Isaac Pereire », appartiennent à ce groupe. Certains hybrides de thé et hybrides perpétuels très robustes peuvent être incorporés à ce groupe et traités comme des arbustes.

La première année

Même traitement que pour les plantes du 1^{er} groupe.

La deuxième année et les suivantes

Les rosiers établis du 3^e groupe diffèrent de ceux du 2^e en ce sens qu'ils fleurissent plus ou moins périodiquement en été et en automne aussi bien sur le bois de l'année que sur les latéraux et sublatéraux issus du bois de 2 ans et plus. Beaucoup produisent


des pousses longues, flexibles et robustes, tant de la base que sur les fortes tiges. Ces pousses jeunes deviennent souvent autant de rameaux fleuris à leur sommet dans l'année en cours, contrairement aux rosiers du 2^e groupe.

Une taille sévère ou modérément sévère de tous ces rosiers en hiver produit des pousses vigoureuses, mais qui ne fleurissent pas toujours ou mal. De ce fait, la floraison est intermittente au lieu d'être continue. Les meilleurs résultats s'obtiennent donc avec une taille légère.

Les rosiers du 3^e groupe ont tendance à produire des latéraux et sublatéraux florifères durant tout l'été, et cette végétation conduit à un dense réseau de brindilles du genre nid d'oiseau. Éclaircir moyennement pendant la période de floraison pour la prolonger.

Autrement la taille d'hiver est la même que pour le 2^e groupe. Les pousses faibles sont à éliminer en totalité.

La deuxième année



1. Février à mars

Tailler les très longues pousses d'un an de la base ou proches de la base d'un tiers de leur longueur. Respecter la voûte formée. Tailler les pousses latérales qui ont fleuri à 2-3 yeux (10 à 15 cm). Supprimer les pousses faibles *ou mal placées*



2. Juin à juillet

La floraison a lieu sur les latéraux issus du bois de la saison précédente. Les pousses de la base et proches de la base se développent. Taille d'entretien d'été.



3. Août à septembre

La floraison se produit sur le bois de l'année. De maigres sous-latéraux se sont développés après la taille d'été.



4. Octobre

Raccourcir les très longues pousses pour minimiser les effets du vent.

La troisième année et les suivantes



5. Février à mars


Tailler les très longues pousses d'un an de la base ou proches de la base d'un tiers de leur longueur. Respecter la voûte formée. Tailler les latéraux sur les pousses qui ont fleuri.

dans la saison à 2-3 yeux (7 à 15 cm). Respecter à la base les vieilles pousses malades ou mal placées - bien travailler



6. Juin à juillet

La floraison a lieu sur les latéraux issus du bois de la saison précédente. Les pousses de la base ou proches de la base se développent. Taille d'été.



Rosiers paysagers



Rosiers lianes





Rénovation (rajeunissement)

La première année



Des rosiers non taillés et négligés peuvent continuer à fleurir pendant des années, mais ils ont généralement triste aspect quand ils présentent l'enchevêtrement d'une masse de rameaux maigres, de bois mort ou malade après la floraison. Même les fleurs, observées de près, sont atrophiées, petites et moins nombreuses que si quelques soins avaient été prodigués aux rosiers. Certaines variétés de grimpants, particulièrement vigoureuses, abandonnées à elles-mêmes, vont se maintenir pendant 20 ans et plus. C'est le cas du *Rosa filipes*, mais ce sont là des exceptions, la plupart demandent à être entretenues et taillées pour conserver une belle végétation et fleurir abondamment.

Que fait le jardinier face à un rosier envahissant et négligé? Sa première réaction est de le laisser dans son état ou de l'arracher pour le remplacer par un nouveau sujet. Il

faut dire que la plupart des rosiers sont très résistants et vivaces et supportent d'être rabattus au niveau du sol si cette opération radicale s'accompagne de soins, de beaucoup d'eau et de fumier. Bien que cette solution horrifie certains jardiniers, elle a le mérite, en bien des cas, de réussir et d'être simple. Cependant ce n'est qu'un extrême recours qui n'est pas vraiment recommandé. Par un entretien assez suivi, on obtient de meilleurs résultats et même sur des rosiers négligés il y a suffisamment de belles pousses pour maintenir l'ossature principale.

latérales faibles sont également à supprimer, tandis que les plus fortes sont à tailler à 2-3 yeux (15 cm). Apporter un surfaçage épris de fumier bien consommé ou de compost au pied de la plante au printemps, ainsi qu'un engrais destiné au feuillage à appliquer à 2 ou 3 semaines d'intervalle pendant la saison. Cela donnera un coup de fouet aux départs de la base.

La deuxième année


En hiver couper à la base tout le vieux bois. Tailler les latéraux à 2-3 yeux (15 cm). La fumure est nécessaire pour maintenir la vigueur. Au cours de l'été suivant, l'ossature du rosier, jusque-là négligée, devrait être reconstituée. Tailler alors normalement. La rénovation peut se réaliser entièrement en 3 ans, mais la plupart des rosiers sont régénérés en 2 ans.

La première année


Éliminer en hiver tout ce qui n'est pas valable ainsi que les gourmands qu'on trouve toujours sur des plantes greffées. Supprimer environ la moitié des grandes pousses en conservant les plus robustes. Les pousses

La deuxième année


1. Février à mars
Éliminer les pousses faibles ou malades et le bois mort. Couper la moitié des tiges principales à la base en conservant les plus vigoureuses. Tailler les pousses latérales à 2-3 yeux (15 cm).



3. Juin à juillet
Les fleurs apparaissent sur les latéraux *issus de vieux bois car que de nouvelles pousses à la base*




4. Février à mars
Supprimer ce qui reste de vieilles tiges à la base - tailler les latéraux à 2-3 yeux + N°2



5. Juin à juillet
La touffe fleurit sur le bois de l'année et l'ossature se garnit de jeunes pousses

2. Dans le même temps
Rafraîchir à la serpette les coupes principales + mortier + fumier *des tiges*



La tige supérieure est supprimée, afin que la tige inférieure profite de davantage de sève.

Avant... Rosiers buissons vigoureux taillés mais beaucoup trop long, le bas est dénudé, les fleurs sont à 2 mètres de hauteur





Une année après restructuration du rosier : réaction du sujet = rajeunissement !



*...mais taille de nouveau trop longue du propriétaire = re-taille à 4 ou cinq yeux
compte tenu d'une variété très vigoureuse, 'Queen Elisabeth'*





Technique
anglaise
pour induire
une floraison généreuse
sur grimpants
ou arbustifs



Technique anglaise pour induire une floraison généreuse sur grimpants ou arbustifs



SENS

5 Rosiers

- | | | |
|---|--|---|
| ◆ A la plantation | Amendement organique S35
Compost SMEV | 1 l/rosier
15 l/rosier |
| ◆ Au travaux d'hiver : | | |
| Fumier déshydraté (en cas de bêchage) | | 500 gr/m² |
| ou | | |
| Amendement organique S35 (en cas de griffage) | | 3 l/m² |
| ◆ Au griffage printemps avant désherbant : | | |
| Engrais retard 20.9.20 (Multigreen) | | 50 gr/m² |
| ◆ En Juillet après floraison : | | |
| Engrais retard 20.9.20 (Multigreen) | | 50 gr/m² |

D A C C

Questions puis... application pratique sur le terrain !







Fin...

Bibliographie des croquis sur la taille :
La Taille Christopher Bricked Ed. Fernand Nathan,
Photos : Jean-Luc Boulard